

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Tabla de dosis para el acetaminofén

Acetaminofén o paracetamol (marcas como Tylenol®, Feverall®, Tempra®) es un medicamento de venta libre que se usa para reducir la fiebre y aliviar el dolor. La dosificación inapropiada es uno de los mayores problemas para darle acetaminofén a los niños. La siguiente tabla, basada en el peso corporal del niño, puede ayudar a determinar la dosis correcta, pero no es sustituto del consejo y recomendación de su pediatra.

Tabla de dosis del acetaminofén (paracetamol) para la fiebre y el dolor

Peso del niño en libras	6-11	12-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60-71	72-95	96+	
Jarabe: 160 mg/5 mL	1,25	2,5	3,75	5	7,5	10	12,5	15	20	mL
Masticable 80 mg	--	--	1 ½	2	3	4	5	6	8	Tableta
Masticable 160 mg	--	--	--	1	1 ½	2	2 ½	3	4	Tableta
Para adulto 325 mg	--	--	--	--	--	1	1	1 ½	2	Tableta
Para adulto 500 mg	--	--	--	--	--	--	--	1	1	Tableta

*Lea las notas de la tabla a continuación

Notas de la tabla:

- **Precaución:** Desde mayo de 2011 se anunció un cambio a una concentración estándar de (160 mg/5 ml) del medicamento acetaminofén líquido para bebés y niños. Hasta ese momento, había principalmente 2 concentraciones: 80 mg/0,8 ml (gotas para bebé concentradas) y 160 mg/5 ml (suspensión infantil líquida o jarabe). Si todavía tiene gotas de 80 mg/0,8 ml es su boticario, deben de desecharlas.
- **Límite de edad:** No utilice en niños menores de 12 semanas de edad (razón: la fiebre durante las primeras 12 semanas de vida se debe documentar en un ambiente médico y si está presente, su bebé necesita una evaluación completa). **Excepción:** Fiebre por vacunación si el niño tiene 8 semanas o más de edad. Evite los productos con múltiples ingredientes en niños menores de 6 años de edad.
- **Dosis:** Se determina encontrando el peso del niño en la primera fila de la tabla de dosis.
- **Medida de la dosis (in unidades métricas):** Las jeringas dosificadoras son más exactas que los utensilios de cocina caseros. Utilice una jeringa o el dispositivo que venga con el medicamento. Si el medicamento no tiene un dispositivo para medir, pídale una jeringa al boticario. Los utensilios caseros no son fiables. **Nota:** una cucharadita nivelada equivale a 5 ml y que ½ cucharadita equivale a 2,5 ml.
- **Frecuencia:** Repita cada 4-6 horas según sea necesario. No la administre más de 5 veces al día.
- **Dosis para adultos:** 650 mg MÁXIMO: 3.000 mg en un período de 24 horas.
- **Derretibles** (derrite o deslíe) : Tabletas solubles que vienen en 80 mg y 160 mg (concentración para niños)
- **Supositorios:** El acetaminofén viene además en supositorios de 80, 120, 325 y 650 mg (la dosis rectal es la misma que la dosis administrada por vía oral).

- **Liberación o acción prolongada:** Evite los productos por vía oral de 650 mg en los niños (razón: son de liberación prolongada durante 8 horas).

Información adicional:

- La fiebre y su bebé (</spanish/health-issues/conditions/fever/paginas/fever-and-your-baby.aspx>)
- Cómo tomarle la temperatura a un niño (</spanish/health-issues/conditions/fever/paginas/how-to-take-a-childs-temperature.aspx>)

Última actualización 1/12/2017

Fuente American Academy of Pediatrics (Copyright © 2016)

La información contenida en este sitio web no debe usarse como sustituto al consejo y cuidado médico de su pediatra. Puede haber muchas variaciones en el tratamiento que su pediatra podría recomendar basado en hechos y circunstancias individuales.

Contáctenos (<https://www.healthychildren.org/spanish/paginas/contact-us.aspx>)

¿Quiénes somos? (<https://www.healthychildren.org/spanish/paginas/about-aap.aspx>)

Política de privacidad (<https://www.healthychildren.org/spanish/paginas/privacy-policy.aspx>)

Términos de uso (<https://www.healthychildren.org/spanish/paginas/terms-of-use.aspx>)

Política editorial (<https://www.healthychildren.org/spanish/paginas/editorial-policy.aspx>)



ie HONcode standard for trustworthy health (<http://www.healthonnet.org/HONcode/Conduct.html>)

© derechos de autor 2017 American Academy of Pediatrics. Todos los derechos reservados.